

(参考)

○一般用医薬品の使用上の注意記載要領の新旧対照表

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
一般用医薬品の使用上の注意記載要領	一般用医薬品の使用上の注意記載要領
<u>第1 使用上の注意記載要領の趣旨</u> 1. 一般用医薬品の <u>使用及び取扱い上の注意</u> は、 薬事法第52条第1号の規定に基づき、一般用医 薬品の適正な使用を図り、安全を確保するため に、一般使用者に対して必要な情報を提供する目的 で当該医薬品の <u>製造販売業者</u> が医薬品の添付 文書又はその容器若しくは被包に記載するもの である。 2. 本要領は、添付文書又はその容器若しくは被 包に記載すべき、使用及び取扱い上の注意のほか、 外部の容器又は外部の被包に記載する事項につ いても規定した。 3. 本要領にいう「副作用」とは、当該医薬品を 使用した結果、人体に発現する有害反応をいう。	<u>第1 使用上の注意の記載に際しての原則</u> 1. 一般用医薬品の「 <u>使用上の注意</u> 」は、薬事法 第52条第1号の規定に基づき、一般用医薬品の 適正な使用を図り、安全を確保するために、一般 使用者に対して必要な情報を提供する目的で当 該医薬品の <u>製造業者</u> 又は輸入販売業者が医薬品 の添付文書又はその容器若しくは被包に記載す るものであること。
<u>第2 使用上の注意等の記載に際しての原則</u> <u>1. 記載する内容</u> 原則として、次の事項を含むこと。 (1) (略) (2) 当該医薬品の効能又は効果、用法及び用量、 成分及び分量、副作用、剤形・形状等からみ て必要な注意事項 (3) (略) <u>2. 記載項目、順序及び要領</u> 原則として <u>第3</u> 及び <u>第4</u> に従うほか、次によること。 (1) (略) (2) (略)	<u>2. 「<u>使用上の注意</u>」に記載する内容は、原則と して、次の事項を含むこと。</u> (1) (略) (2) 当該医薬品の効能又は効果、用法及び用量、 副作用、剤形・形状等からみて必要な注意事 項 (3) (略) <u>なお、本要領にいう「副作用」とは、当該医薬品 を使用した結果、人体に発現する有害反応をい う。</u> <u>3. 記載順序及び要領は、原則として「<u>第2 記 載項目及び記載順序</u>」及び「<u>第3 各項目の記載 事項</u>」に掲げるものに従うほか、次によること。</u> (1) (略) (2) (略)

(3) 各項目には、第3に掲げる項目名を明示した上で記載する。ただし、「その他」にあっては「その他」という項目名は使用せずに、個々に項目名を設定すること。また、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」については、項目名を枠で囲む、文字の色やポイントを変える、イラストを挿入する等により目立つように記載すること。

3. 記載に当たって的一般的な留意事項

- (1) 一般使用者が理解しやすく自ら判断できる内容とするために、分かりやすい用語を用い、平易な表現で簡潔に記載すること。
- (2) (略)
- (3) 各注意事項の内容を理解しやすくするために適當と考えられる場合には、注意事項の記載理由を（）で簡単に記載しても良いこと。
- (4) 外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項については、一般使用者の目にとまりやすい場所に記載すること。
- (5) (略)
- (6) (略)

(3) 各項目は「第2 記載項目及び記載順序」に掲げる項目名を明示した上で記載すること。ただし、「その他」にあっては「その他」という項目名は使用せずに、個々に項目名を設定すること。また、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」については、項目名を枠で囲む等により目立つように記載すること。

4. 添付文書の記載に際しては、一般使用者が理解しやすく自ら判断できる内容とするために、平易な表現で簡潔に記載すること。

5. (略)

6. (略)

7. (略)

8. 次の事項については、外部の容器又は外部の被包の使用者の目にとまりやすい場所に、別途記載すること。

- (1) 次の人は使用（内服剤の場合には「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。）しないこと
- (2) 次の部位には使用しないこと
- (3) 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項
- (4) 添付文書の必読に関する事項
- (5) 医薬品の保管に関する事項
- (6) 医薬品である旨
- (7) その他、外部の容器又は外部の被包に記載することが適當と考えられる事項

<p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用（内服剤の場合には、適宜、「使用」に代えて「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。）しないこと</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) (略)</p> <p>(4) (略)</p>	<p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) (略)</p> <p>(4) (略)</p>
<p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に医師、歯科医師（歯科医師については、歯科医師が関係する場合にのみ記載する。以下、本記載要領において同じ。）、薬剤師又は登録販売者（第一類医薬品には登録販売者は記載しないこと。以下、本記載要領において同じ。）に相談すること</p> <p>(2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>(3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>(4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	<p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること（歯科医師については、歯科医師が関係する場合にのみ記載すること。以下同じ。）</p> <p>(2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。</p>
<p>(5) その他</p> <p>3. (略)</p> <p>4. (略)</p>	<p>(3) その他</p> <p>3. (略)</p> <p>4. (略)</p>
<p>第4 各項目の記載要領</p> <p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>ア. 効能又は効果の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体质、妊娠の可能</p>	<p>第3 各項目の記載要領</p> <p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>ア. 適応症（効能又は効果）の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往歴、家族歴、</p>

<p>性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意事項を記載する。</p> <p>イ. 効能又は効果の範囲以外で、誤って使用されやすい類似の疾病や症状がある場合は、その内容を記載する。</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 同種同効の医薬品又は相互作用を起こしやすい医薬品との併用に関する注意事項を記載する。</p> <p>(4) その他</p> <p>ア. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品の場合、本剤の使用期間中は授乳しない又は授乳期間中は本剤を使用しない旨の注意を記載する。</p> <p>イ. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する注意事項がある場合には、その副作用の内容及びそのような作業に従事しない旨の注意を記載する。</p> <p>ウ. アルコール等の食品と相互作用を起こす可能性がある場合には、本剤の使用中には、その食品を摂取しない旨の注意を記載する。</p> <p>エ. その他、重大な副作用又は事故を防止する目的で当該項目に記載することが適当であると判断される事項があれば記載する。</p> <p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に<u>医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者</u>に相談すること 疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用するこ</p>	<p>体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意事項を記載すること。</p> <p>イ. 適応症の範囲以外で、誤って使用されやすい類似の疾病や症状がある場合には、その内容を記載すること。</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 同種同効の医薬品又は相互作用を起こしやすい医薬品との併用に関する注意事項を記載すること。</p> <p>(4) その他</p> <p>ア. 当該医薬品の乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある場合には、当該医薬品の使用期間中は授乳しない又は授乳期間中に当該医薬品を使用しない旨の注意を記載すること。</p> <p>イ. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する注意事項がある場合には、その副作用の内容及びそのような作業に従事しない旨の注意を記載すること。</p> <p>ウ. アルコール等の食品と相互作用を起こす可能性がある場合には、当該医薬品の使用中には、その食品を摂取しない旨の注意を記載すること。</p> <p>エ. その他、重大な副作用又は事故を防止する目的で当該項目に記載することが適当であると判断される事項があれば記載すること。</p> <p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に<u>医師、歯科医師又は薬剤師</u>に相談すること 疾病の種類、症状、合併症、既往歴、家族歴、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用するこ</p>
--	---

<p>とが不適当な場合について記載する。</p>	<p>することが不適当な場合について記載すること。</p>
<p>(2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	<p>(2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること</p>
<p>ア. 副作用のうち、本剤の使用を続けると症状が重くなったり、症状が長く続くおそれのあるものについて記載することとし、一般使用者が判断できる初期症状を主に記載すること。</p>	<p>ア. 副作用のうち、当該医薬品の使用を続けると症状が重くなったり、症状が長く続く恐れのあるものについて記載することとし、一般使用者が判断できる初期症状を主に記載すること。</p>
<p>イ. 副作用の内容は一般的な副作用とまれに発生する重篤な副作用に分けて、表形式にする等わかりやすいよう工夫して記載すること。</p>	<p>イ. 副作用の内容は一般的な副作用とまれに発生する重篤な副作用に分けて、表形式にする等わかりやすいよう工夫して記載すること。</p>
<p>ウ. 副作用の記載に当たっては、最初に、一般的な副作用について発現部位別に症状を記載し、次に、まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状を記載すること。</p>	<p>ウ. 副作用の記載に当たっては、最初に、一般的な副作用について発現部位別に症状を記載し、次に、まれに発生する重篤な副作用について副作用名毎に症状を記載すること。</p>
<p>なお、重篤な副作用の発現時には医療機関を受診する旨を記載すること。</p>	<p>なお、重篤な副作用の発現時には医療機関を受診する旨を記載すること。</p>
<p>(3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	<p>エ. 一定の期間又は回数使用しても症状の改善がみられない場合に関する注意事項も本項目に記載すること。期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載すること。</p>
<p>本剤の薬理作用等から発現が予想され、容認される軽微な症状であるが、症状の持続又は増強がみられた場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載すること。</p>	
<p>(4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	
<p>一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載すること。この場合、期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載すること。</p>	
<p>(5) その他 上記(1)から(4)に分類されない相談すべき注</p>	<p>(3) その他 上記(1)及び(2)に分類されない相談すべき注</p>

<p>意事項があれば記載すること。</p> <p>3. その他の注意</p> <p>1 又は 2 に分類されない使用上の注意があれば記載すること。</p> <p>4. 保管及び取扱い上の注意</p> <p>次のような事項を記載する。</p> <p>(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載する。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載する。</p> <p>(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点からも好ましくないので、その旨を記載する。また、携帯容器（薬剤を移し替えて品質上、問題ないことを担保した容器）が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の注意を記載する。</p> <p>(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載する。</p> <p>第5 外部の容器又は外部の被包の記載項目、記載順序及び記載要領</p> <p>1. 「次の人は使用しないこと」 第4の1. (1) に準じて記載する。</p> <p>2. 「次の部位には使用しないこと」 第4の1. (2) に準じて記載する。</p> <p>3. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品に関する注意事項 第4の1. (4) アに準じて記載する。</p> <p>4. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項</p>	<p>意事項があれば記載すること。</p> <p>3. その他の注意</p> <p>(1) <u>当該医薬品の薬理作用等から予想される作用であって、容認される軽微なものがある場合には、その作用が起こり得る旨を記載すること。</u></p> <p>(2) <u>その他、1 及び 2 に分類されない使用上の注意があれば記載すること。</u></p> <p>4. 保管及び取扱い上の注意</p> <p><u>保管及び取扱いに関する一般的注意事項として、主として次のような事項を記載すること。</u></p> <p>(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載すること。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載すること。</p> <p>(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点からも好ましくないので、その旨を記載すること。また、携帯容器が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の注意を記載すること。</p> <p>(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載すること。</p>
---	---

<p>第4の1. (4) イに準じて記載する。</p> <p>5. 専門家への相談の勧奨に関する事項</p> <p>「次の人には使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」</p> <p>第4の2. (1) に準じて記載する。</p> <p>ただし、外部の容器等の記載スペースが狭小なために購入時に専門家に相談すべき場合を具体的に記載できない場合は、「使用が適さない場合があるので、購入時には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載する。</p> <p>6. 添付文書の必読に関する事項</p> <p>7. 医薬品の保管に関する事項</p> <p>第4の4. に準じて記載する。</p> <p>8. 以下の項目等、その他外部の容器又は外部の被包に記載することが適當と考えられる事項</p> <p>(1) リスク区分表示</p> <p>薬事法施行規則第209条の2及び第210条第5号の規定に基づき、一般用医薬品のリスク区分の表示を記載すること。</p> <p>(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する表示</p> <p>平成20年8月5日付け薬食総発第0805001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知「一般用医薬品外箱等への副作用被害救済制度の表示に関する自主申し合わせ及び質疑応答集(改訂)について」を参考とすること。なお、改正があった場合には最新の通知等に従うこと。</p> <p>(3) 消費者相談窓口</p> <p>一般使用者からの当該医薬品についての相談に応じができる連絡先等を記載すること。</p>	
---	--